

	<p style="text-align: center;">成大醫院 National Cheng Kung University Hospital</p>		<p style="text-align: center;">14 號</p>	<p style="text-align: center;">核子醫學部 注意事項說明書</p>
<p style="text-align: center;">檢 查 名 稱</p>	<p style="text-align: center;">碘-131 甲狀腺攝取率及掃描 I-131 Thyroid Scan and Uptake</p>			
<p style="text-align: center;">檢 查 地 點</p>	<p style="text-align: center;">住院大樓(舊棟)一樓核子醫學部 (請詳核醫地點圖示)</p>	<p style="text-align: center;">聯 絡 電 話</p>	<p style="text-align: center;">(06)2353535-2470、2471</p>	
<p style="text-align: center;">主要目的</p>	<p>一、甲亢診斷、指導用藥和療效觀察。 二、甲低診斷和治療藥量監測。 三、亞急性甲狀腺炎的診斷。 四、慢性淋巴細胞性甲狀腺炎的診斷。 五、異位甲狀腺的診斷。 六、甲狀腺結節功能的判斷和良惡性的鑒別診斷。 七、判斷頸部腫塊與甲狀腺的關係。 八、甲狀腺切除手術後殘留甲狀腺組織的觀察。 九、甲狀腺大小和重量的估計。</p>			
<p style="text-align: center;">檢查流程</p>	<p>一、本檢查需禁食 6 小時以上。 二、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫並核對您的名字。 三、先至注射室，醫護人員請您倒一杯水，教導您如何服藥，並完成服藥。 四、服藥完畢，醫護人員會與您約定造影時間 (須約等候 2 小時，等候時間可自由活動。) 五、依約定時間至等候區等候，輪到您時，放射師會出來呼叫、核對您的名字再至核醫造影室，造影時間約 5 分鐘。 六、第一次造影完成後，放射師會與您約第二次造影的時間(檢查需要 24 小時後檢查，故與您約隔日早上回來造影，第二天檢查前不需要禁食)。 七、第二天早上不需報到，依照約定時間至等候區等候，輪到您時，放射師會出來呼叫、核對您的名字至核醫造影室，依放射師指示平躺檢查床上，造影時間約 10-15 分鐘，過程中不會有任何不舒服。 八、至等候區等候，核醫科住院醫師會至櫃檯詢問您病史與情況，待問診完畢後即可離開，完成本次檢查。</p>			
<p style="text-align: center;">注意事項</p>	<p>一、本檢查需禁食至少 6 小時以上。 二、做本檢查 3-5 天不能服用抗甲狀腺藥物及含碘藥物(例如紫菜、海帶)， 可視醫師需求調整病患停用抗甲狀腺藥物的時間，檢查當日前需禁食 6-8 小時，您需要連續二天來做檢查(吃本檢查藥後 2 小時及 24 小時)，第二天檢查不需禁食，請預留充分時間，</p>			

	<p>三、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。</p> <p>四、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。</p> <p>五、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。</p> <p>六、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性（其時效性極短且非常昂貴），為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本部受檢，請於受檢前兩個工作天通知本部，以利更改日期。</p> <p>七、本部影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 1 天。</p>	
編碼	修訂日期 年 月 日	說明書修訂版本 第一版