

	<p style="text-align: center;">成大醫院 National Cheng Kung University Hospital</p>		<p>7 號</p>	<p style="text-align: center;">核子醫學部 注意事項說明書</p>
<p>檢 查 名 稱</p>	<p>胃食道逆流檢查 Enterogastroesoph-ageal Reflux</p>			
<p>檢 查 地 點</p>	<p>住院大樓(舊棟)一樓核子醫學部 (請詳核醫地點圖示)</p>	<p>聯絡 電話</p>	<p>(06)2353535-2470、2471</p>	
<p>主要目的</p>	<p>一、評估胃-食道逆流的情形及嚴重度。 二、評估是否有逆流物吸入肺臟的情形。</p>			
<p>檢查流程</p>	<p>一、本檢查當日必須禁食早餐，空腹至少 4 小時以上。 二、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有放射師會呼叫、核對您的名字通知您解小便後再至核醫造影室。 三、將放射性藥物(Tc-99m DTPA)加到 300c.c.的橘子水(酸)或果汁中，請您盡快喝完。 四、喝完藥物後立即進行造影，本檢查需靜躺檢查床上造影約 60 分鐘，檢查中並不會有任何痛苦。</p>			
<p>注意事項</p>	<p>一、本檢查需禁食 4 小時以上。 二、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。 三、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。 四、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。 五、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性（其時效性極短且非常昂貴），為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本部受檢，請於受檢前兩個工作天通知本部，以利更改日期。 六、本部影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 1 天。</p>			
<p>編碼</p>	<p>修訂日期 年 月 日</p>		<p>說明書修訂版本 第一版</p>	