

	<p style="text-align: center;">成大醫院 National Cheng Kung University Hospital</p>		<p>10 號</p>	<p>核子醫學部 注意事項說明書</p>
<p>檢 查 名 稱</p>	<p>碘-131 全身性攝影 I-131 Whole Body Scan</p>			
<p>檢 查 地 點</p>	<p>住院大樓(舊棟)一樓核子醫學部 (請詳核醫地點圖示)</p>	<p>聯絡 電話</p>	<p>(06)2353535-2470、2471</p>	
<p>主要目的</p>	<p>一、甲狀腺癌開刀後追蹤檢查</p>			
<p>檢查流程</p>	<p>一、本檢查當日必須禁食早餐，空腹至少 4 小時以上。 二、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫並核對您名字。 三、至注射室，醫護人員服藥前會與您做相關衛教及注意事項，衛教完後服用核醫藥物：I-131 3mci，服藥後即可先行離開，依醫護人員跟您約定的時間再回來造影(通常會跟您約定服用 I-131 藥物後 4 日回來造影)。 四、依照約定時間報到，至等候區等候，會有放射師出來呼叫、核對您的名字並通知您先解小便後至核醫造影室。 五、依放射師指示靜躺檢查床上造影約 20-30 分鐘，檢查中並不會有任何痛苦。</p>			
<p>注意事項</p>	<p>一、本檢查當日必須禁食早餐，空腹至少 4 小時以上。 二、請停止服用抗甲狀腺藥物及含碘食品(如海帶、紫菜等)，至少停用 3-5 天(可視醫師需求調整病患停用抗甲狀腺藥物的時間)。 三、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。 四、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。 五、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。 六、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性(其時效性極短且非常昂貴)，為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本部受檢，請於受檢前兩個工作天通知本部，以利更改日期。 七、本部影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 3 天。</p>			
<p>編碼</p>	<p>修訂日期 年 月 日</p>	<p>說明書修訂版本 第一版</p>		