

	<p style="text-align: center;">成大醫院 National Cheng Kung University Hospital</p>		<p style="text-align: center;">26 號</p>	<p style="text-align: center;">核子醫學部 注意事項說明書</p>
<p>檢 查 名 稱</p>	<p>膀胱輸尿管尿逆流 Vesicoureteral Reflux</p>			
<p>檢 查 地 點</p>	<p>住院大樓(舊棟)一樓核子醫學部 (請詳核醫地點圖示)</p>	<p>聯絡 電話</p>	<p>(06)2353535-2470、2471</p>	
<p>主要目的</p>	<p>一、評估是否有尿路逆流。</p>			
<p>檢查流程</p>	<p>一、檢查前 30 分鐘請喝 300-500cc 的水。 二、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫並核對您的名字。 一、由臨床醫師決定是否以直接或間接方式做檢查，如為直接方式則會請本科住院醫師與護理師協助放置導尿管。 二、導尿管放置完成，會帶您至造影室，醫護人員會接點滴至導尿管，將加有核醫藥物：Tc-99m DTPA 的點滴經由導尿管灌入膀胱，並立即開始造影，本次造影須靜躺約 1 小時，檢查中並不會有任何痛苦。 五、如為間接方式，醫護人員會由您的靜脈注射核醫藥物：Tc-99m DTPA 和 Lasix，注射完後持續補充水分並請您於第一次漲尿時先解乾淨小便，解完後至等待區持續補充水分，等待第二次膀胱脹尿時告知檢查人員，放射師會請您去造影室立即開始造影，造影時間一般約為 5 分鐘，膀胱脹尿到造影的步驟須 2~3 次操作，檢查的方式須以邊解小便邊造影(拿尿壺或坐尿盆)。 六、若是無法配合檢查之嬰幼兒，則需給予鎮靜劑入睡後才能執行上述之檢查，檢查完成後待嬰幼兒醒來經醫師評估才可離開，回家應觀察嬰幼兒睡眠狀況，如有異狀應立即回院觀察。</p>			
<p>注意事項</p>	<p>一、本檢查不需禁食，生活作息如常。 二、檢查前 30 分鐘請喝 300-500cc 的水，檢查時間約 2 小時。 三、需視臨床醫師要求，必要時需插導尿管。 四、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。 五、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。 六、嬰幼兒如因配合檢查需要鎮靜者，請於檢查前勿讓小朋友睡覺，檢查前會予以灌睡。 七、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。 八、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性(其時效性極短且非常昂貴)，為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本部受檢，請於受檢前兩個工作天通知本部，以利更改日期。 九、本部影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中</p>			

	孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 1 天。	
編碼	修訂日期 年 月 日	說明書修訂版本 第一版