

	<p style="text-align: center;">成大醫院 National Cheng Kung University Hospital</p>		<p style="text-align: center;">25 號</p>	<p style="text-align: center;">核子醫學部 注意事項說明書</p>
<p>檢 查 名 稱</p>	<p>腎功能測定/(有效腎血漿流量) Comprehensive renal function +Lasix</p>			
<p>檢 查 地 點</p>	<p>住院大樓(舊棟)一樓核子醫學部 (請詳核醫地點圖示)</p>	<p>聯 絡 電 話</p>	<p>(06)2353535-2470、2471</p>	
<p>主要目的</p>	<p>一、總腎功能和個別腎功能的判斷。 二、移植腎功能的監測。 三、腎性高血壓的評估。</p>			
<p>檢查流程</p>	<p>一、檢查前 30 分鐘，請喝 300-500cc 的水。 二、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫並核對您的名字。 三、先至注射室，醫護人員會在您身上留置靜脈留置針。如需打 Lasix 則會從靜脈留置針頭注射。 三、至等候區等候，放射師會呼叫、核對您的名字至造影室，依放射師指示平躺於檢查床，會由醫護人員由留置針頭注射核醫藥物：Tc-99m MAG3。 四、注射藥物後開始檢查，從造影到最後抽血的步驟約需 60 分鐘，造影只需平躺在檢查床上，過程不會有任何痛苦。7 歲以下嬰幼兒造影結束即完成檢查(不須抽血)。完成檢查後，醫護人員會幫您拔除靜脈留置針。 五、7 歲以上受檢者，須在等候區等候，醫護人員請您至注射室抽約 5cc 的血，作為計算腎功能測定用。 六、若是無法配合檢查之嬰幼兒，則需給予鎮靜劑入睡後才能執行上述之檢查，檢查完成後待嬰幼兒醒來經醫師評估才可離開，回家應觀察嬰幼兒睡眠狀況，如有異狀應立即回院觀察。</p>			
<p>注意事項</p>	<p>一、本檢查不需禁食，生活作息如常。 二、檢查前 30 分鐘請喝 300-500cc 的水，檢查時間約 60 分鐘。 三、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。 四、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。 五、嬰幼兒如因配合檢查需要鎮靜者，請於檢查前勿讓小朋友睡覺，檢查前會予以灌睡。 六、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。 七、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性(其時效性極短且非常昂貴)，為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不</p>			

	<p>克至本部受檢，請於受檢前兩個工作天通知本部，以利更改日期。</p> <p>八、本部影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 1 天。</p>	
編碼	修訂日期 年 月 日	說明書修訂版本 第一版