

	<p style="text-align: center;"><b>成大醫院</b> <b>National Cheng Kung University Hospital</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>35 號</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>核子醫學部</b> <b>注意事項說明書</b></p>
<p>檢 查 名 稱</p>	<p>淋巴攝影 <b>Lymphoscintigraphy</b></p>			
<p>檢 查 地 點</p>	<p>住院大樓(舊棟)一樓核子醫學部 (請詳核醫地點圖示)</p>	<p>聯絡 電話</p>	<p><b>(06)2353535-2470、2471</b></p>	
<p>主要目的</p>	<p>一、淋巴瘤輔助診斷 二、惡性腫瘤淋巴轉移的診斷 三、先天性或寄生蟲病所致淋巴系嚴重梗阻的診斷。</p>			
<p>檢查流程</p>	<p>一、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前會有放射師呼叫、核對您的名字並通知您先解小便後再至核醫造影室。 二、依放射師指示平躺於檢查床上，醫護人員會至您身邊靜脈注射核醫藥物：Tc-99m Phytate，上肢注射為皮下手背部，下肢注射為皮下足踝處，並立即造影，本檢查需靜躺檢查床上造影約 2-4 小時，檢查中並不會有任何痛苦。</p>			
<p>注意事項</p>	<p>一、本檢查不需禁食，生活作息如常。 二、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。 三、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請<b>務必事前告知</b>排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。 四、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。 五、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性（其時效性極短且非常昂貴），為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本部受檢，請於受檢前兩個工作天通知本部，以利更改日期。 六、本部影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 1 天。</p>			
<p style="text-align: center;">編碼</p>	<p style="text-align: center;">修訂日期 年 月 日</p>	<p style="text-align: center;">說明書修訂版本 第一版</p>		