

	<p style="text-align: center;">成大醫院 National Cheng Kung University Hospital</p>		<p>5 號</p>	<p style="text-align: center;">核子醫學部 注意事項說明書</p>
<p>檢 查 名 稱</p>	<p>腸胃道出血造影檢查 G-I Bleeding Study</p>			
<p>檢 查 地 點</p>	<p>住院大樓(舊棟)一樓核子醫學部 (請詳核醫地點圖示)</p>	<p>聯絡 電話</p>	<p>(06)2353535-2470、2471</p>	
<p>主要目的</p>	<p>部分病患腸胃道出血的位置是胃鏡及大腸鏡檢查所無法偵測的，因此藉由核子醫學科腸胃道出血掃描找到出血的時機及位置。</p>			
<p>檢查流程</p>	<p>一、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫並核對您的名字。</p> <p>二、先至注射室醫護人員會先留置靜脈留置針在您身上，並由留置針頭注射藥物：Cold-PYP。</p> <p>三、請在等候區等候約 15-30 分鐘左右，放射師會出來呼叫、核對您的名字並通知您先解小便後至核醫造影室，造影時護理人員由留置針頭注射 Tc-99m pertechnetate 至您的身上，並同時進行造影，檢查中並不會有任何痛苦。</p> <p>四、以長時間、間斷性的腹部照影，直到找到出血點或醫師決定檢查結束為止，時間會超過 5 小時以上(視狀況有時需做第 24 小時的影像比對)。造影檢查只需靜靜躺著，並不會有任何痛苦。</p>			
<p>注意事項</p>	<p>一、本檢查不需禁食，生活作息如常。</p> <p>二、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。</p> <p>三、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。</p> <p>四、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。</p> <p>五、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性(其時效性極短且非常昂貴)，為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本部受檢，請於受檢前兩個工作天通知本部，以利更改日期。</p> <p>六、本部影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 1 天。</p>			
<p>編碼</p>	<p>修訂日期 年 月 日</p>	<p>說明書修訂版本 第一版</p>		