

	<p style="text-align: center;"><b>成大醫院</b> <b>National Cheng Kung University Hospital</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>20 號</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>核子醫學部</b> <b>注意事項說明書</b></p>
<p>檢 查 名 稱</p>	<p><b>骨髓炎造影檢查</b> <b>Study for osteomyelitis</b> <b>人工關節鬆動之造影檢查</b> <b>Study for Painful Prosthesis</b></p>			
<p>檢 查 地 點</p>	<p>住院大樓(舊棟)一樓核子醫學部 (請詳核醫地點圖示)</p>	<p>聯 絡 電 話</p>	<p><b>(06)2353535-2470、2471</b></p>	
<p>主要目的</p>	<p>一、協助鑑別診斷骨髓炎。 二、協助診斷人工關節鬆動及感染。 三、協助鑑別診斷其他骨骼關節疾病。</p>			
<p>檢查流程</p>	<p>一、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫並核對您的名字。 二、先至注射室，醫護人員會在您身上留置靜脈留置針。 三、至等候區等候，放射師會請您至造影室，依指示平躺於檢查床上，醫護人員會至您身邊從留置針頭注射藥物：Tc-99m MDP，並先進行第一次造影檢查，本次檢查需靜躺 20-30 分鐘，檢查中並不會有任何痛苦。 四、第一次造影結束後，放射師會和您約定第二次造影的時間(須等候約 3 小時左右，等待時間可自行活動並可正常進食)。 五、第一次造影結束後須開始立即補充飲水 1000~2000c.c. (洗腎及限水的病人除外)，以利下午第二次造影讓影像可以更清楚。 六、依約定時間至等候區等候，輪到您時，放射師會呼叫、核對您的名字並通知您先解小便後再至核醫造影室，第二次造影須靜躺約 20-30 分鐘，檢查中並不會有任何痛苦。 七、第二次造影結束後，請至等候區等候，醫護人員會呼叫、核對您的名字並為您從靜脈留置針頭注射核醫藥物 Ga(鎳)-67，注射完後會拔除留置針，醫護人員會與您約定造影時間並給您造影回聯通知單(通常是注射日後 2-3 天回來照相)。 八、依照約定時間至核醫部投回聯通知單，至等候區等候，放射師會呼叫、核對您的名字，並通知您先解小便再至核醫造影室，本次造影須靜躺約 20-30 分鐘，檢查中並不會有任何痛苦。</p>			
<p>注意事項</p>	<p>一、本檢查不需禁食，生活作息如常 二、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。 三、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。</p>			

	<p>四、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。</p> <p>五、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性（其時效性極短且非常昂貴），為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本部受檢，請於受檢前兩個工作天通知本部，以利更改日期。</p> <p>六、本部影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 3 天。</p>	
編碼	修訂日期 年 月 日	說明書修訂版本 第一版