

	<p style="text-align: center;">成大醫院 National Cheng Kung University Hospital</p>		<p style="text-align: center;">6 號</p>	<p style="text-align: center;">核子醫學部 注意事項說明書</p>
<p style="text-align: center;">檢 查 名 稱</p>	<p style="text-align: center;">唾液腺閃爍攝影 Salivary Scintigraphy</p>			
<p style="text-align: center;">檢 查 地 點</p>	<p style="text-align: center;">住院大樓(舊棟)一樓核子醫學部 (請詳核醫地點圖示)</p>	<p style="text-align: center;">聯絡 電話</p>	<p style="text-align: center;">(06)2353535-2470、2471</p>	
<p style="text-align: center;">主要目的</p>	<p>一、唾液腺功能評估，特別是口乾症狀之評估，例如慢性唾液腺炎(如 Sjorgren's 症候群)或接受頭頸部放射治療後。</p> <p>二、某些唾液腺腫瘤之鑑別診斷。</p>			
<p style="text-align: center;">檢查流程</p>	<p>一、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有放射師會呼叫並核對您的名字並通知您解小便後再至核醫造影室</p> <p>二、至造影室，依放射師指示平躺於檢查床上，醫護人員會從靜脈注射藥物：Tc-99m pertechnetate。</p> <p>三、注射藥物後立即進行造影，本檢查需靜躺檢查床上造影至少約 70 分鐘以上，檢查中並不會有任何痛苦。</p>			
<p style="text-align: center;">注意事項</p>	<p>一、本檢查不需禁食，生活作息如常</p> <p>二、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。</p> <p>三、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。</p> <p>四、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。</p> <p>五、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性（其時效性極短且非常昂貴），為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本部受檢，請於受檢前兩個工作天通知本部，以利更改日期。</p> <p>六、本部影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 1 天。</p>			
<p style="text-align: center;">編碼</p>	<p style="text-align: center;">修訂日期 年 月 日</p>	<p style="text-align: center;">說明書修訂版本 第一版</p>		