

	<p style="text-align: center;">成大醫院 National Cheng Kung University Hospital</p>		<p style="text-align: center;">2 號</p>	<p style="text-align: center;">核子醫學部 注意事項說明書</p>
<p>檢 查 名 稱</p>	<p>肝膽道掃瞄 Cholescintigraphy</p>			
<p>檢 查 地 點</p>	<p>住院大樓(舊棟)一樓核子醫學部 (請詳核醫地點圖示)</p>	<p>聯絡 電話</p>	<p>(06)2353535-2470、2471</p>	
<p>主要目的</p>	<p>評估肝膽系統的功能評估。膽道系統的開放狀態及完整性。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一、急性膽囊炎及慢性膽囊炎的評估。 二、膽道結石的評估(膽道系統開放狀態)。 三、黃膽的鑑別診斷。 四、先天性膽道疾病的診斷-先天性膽道閉鎖 atresia 與新生兒肝炎的評估 -異位膽囊或膽道畸形的評估。 五、膽道術後追蹤(膽漏 bile leakage)。 六、十二指腸胃逆流的診斷(膽汁逆流 bile reflux)。 七、腫瘤 / 癌症術前術後之評估(ex: 膽囊、膽管癌, 壺腹癌, 胰臟癌)。 			
<p>檢查流程</p>	<ul style="list-style-type: none"> 一、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫並核對您的名字。 二、先至注射室靜脈注射藥物：Tc-99m Mebrofenin。 三、注射後立即至造影室進行造影檢查，依照放射師指示平躺於檢查床，檢查中並不會有任何痛苦。 四、基本檢查時間約 90 分鐘(依適應症不同，受檢者有的需要執行 4~6 小時或 7~8 小時的造影，新生兒膽道閉鎖評估有時需要第 24 小時的造影，請預先準備充分的時間受檢)。 			
<p>注意事項</p>	<ul style="list-style-type: none"> 一、本檢查當日必需禁食禁食 4~6 小時(如有超過 12 小時請告之工作人員)。 二、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。 三、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。 四、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。 五、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性(其時效性極短且非常昂貴)，為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本部受檢，請於受檢前兩個工作天通知本部，以利更改日期。 六、本部影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 1 天。 			
<p>編碼</p>	<p>修訂日期 年 月 日</p>	<p>說明書修訂版本 第一版</p>		