


| | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------------------------|--|
|  | <p style="text-align: center;">成大醫院 National Cheng Kung University Hospital</p> | | <p>3 號</p> | <p style="text-align: center;">核子醫學部 注意事項說明書</p> |
| <p>檢 查 名 稱</p> | <p>胃幽門竇殘餘攝影 Retained gastric Antrum Study</p> | | | |
| <p>檢 查 地 點</p> | <p>住院大樓(舊棟)一樓核子醫學部 (請詳核醫地點圖示)</p> | <p>聯絡 電話</p> | <p>(06)2353535-2470、2471</p> | |
| <p>主要目的</p> | <p>一、上腹部異位性胃黏膜之偵測。 二、胃部手術後殘留性胃竇組織之偵測。</p> | | | |
| <p>檢查流程</p> | <p>一、本檢查當日必需禁食早餐，至少禁食 6 小時以上。 二、檢查前不可做 X 光鋇劑上腸胃道攝影。 三、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫並核對您的名字。 四、先至注射室靜脈注射藥物：Tc-99m pertechnetate。 五、注射後立即至造影室進行造影檢查，依照放射師指示平躺於檢查床，檢查中並不會有任何痛苦，需約 90 分鐘。</p> | | | |
| <p>注意事項</p> | <p>一、本檢查當日必需禁食早餐，至少禁食 6 小時以上。 二、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。 三、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。 四、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。 五、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性（其時效性極短且非常昂貴），為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本部受檢，請於受檢前兩個工作天通知本部，以利更改日期。 六、本部影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 1 天。</p> | | | |
| <p>編碼</p> | <p>修訂日期 年 月 日</p> | <p>說明書修訂版本 第一版</p> | | |