

	<p style="text-align: center;"><b>成大醫院</b> <b>National Cheng Kung University Hospital</b></p>		<p><b>1 號</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>核子醫學部</b> <b>注意事項說明書</b></p>
<p>檢 查 名 稱</p>	<p><b>肝臟與脾臟掃瞄</b> <b>Liver and spleen Scan with spect</b></p>			
<p>檢 查 地 點</p>	<p><b>住院大樓(舊棟)一樓核子醫學部</b> <b>(請詳核醫地點圖示)</b></p>	<p>聯 絡 電 話</p>	<p><b>(06)2353535-2470、2471</b></p>	
<p>主要目的</p>	<p>評估肝脾腫大、偵測占位性病變(如肝腫瘤、肝膿瘍)、肝硬化。</p>			
<p>檢查流程</p>	<p>一、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫並核對您的名字。 二、先至注射室靜脈注射藥物：Tc-99m phytate。 三、注射核醫藥物後，再至等候區等候照相，等候造影時間約 20-30 分鐘。 四、輪到您時，放射師會出來呼叫、核對您的名字並通知您先去解小後再至核醫造影室。 五、造影檢查時，依放射師指示平躺於檢查床上，造影需時約 20 分鐘，檢查中並不會有任何痛苦。</p>			
<p>注意事項</p>	<p>一、本檢查不需禁食，生活作息如常。 二、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。 三、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請<b>務必事前告知</b>排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。 四、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。 五、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性(其時效性極短且非常昂貴)，為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本部受檢，請於受檢前兩個工作天通知本部，以利更改日期。 六、本部影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 1 天。</p>			
<p>編 碼</p>	<p>修訂日期 年 月 日</p>	<p>說明書修訂版本 第一版</p>		