

	<p style="text-align: center;">成大醫院 National Cheng Kung University Hospital</p>		<p style="text-align: center;">37 號</p>	<p style="text-align: center;">核子醫學部 注意事項說明書</p>
<p>檢 查 名 稱</p>	<p>碘-131 治療(1mCi,調劑費另計) I-131 Treatment</p>			
<p>檢 查 地 點</p>	<p>住院大樓(舊棟)一樓核子醫學部 (請詳核醫地點圖示)</p>	<p>聯絡 電話</p>	<p>(06)2353535-2470、2471</p>	
<p>主要目的</p>	<p>偵測轉移病變、手術後甲狀腺殘餘組織的清除(ablation)、以及及轉移病變的治療。</p>			
<p>檢查流程</p>	<p>一、本檢查需禁食，至少禁食 4 小時以上。</p> <p>二、本檢查分為小劑量(30mci 以下)大劑量(含 30mci 以上)，小劑量會安排時間直接至本科服用藥物，大劑量則需住院隔離，需安排住院時間。</p> <p>三、櫃檯人員與您約定衛教時間(服藥前 2 個禮拜需要低碘飲食及衛教，醫護人員介紹環境並請營養師統一說明低碘上課)。</p> <p>四、a.小劑量(30mci 以下)，須停止服用抗甲狀腺藥物 3-5 天，可視醫師需求調整病患停用抗甲狀腺藥物的時間，如需注射 Thyrotropin alfa 則不需停藥，依照醫師排定注射時間注射。 b.大劑量(含 30mci 以上) 須停止服用甲狀腺藥物至少一個月，可視醫師需求調整病患停用甲狀腺藥物的時間，如需注射 Thyrotropin alfa 則不需停藥，依照醫師排定注射時間注射。</p> <p>五、a.小劑量(30mci 以下)，請您於約定時間至核醫科報到，醫護人員會呼叫您的名字，醫護人員會進行衛教及指導您服用核醫藥物：I-131，並約定回來造影的時間，服用核醫藥物完畢即可離開。 b.大劑量(含 30mci 以上)，超過 30mci 以上需住院成大醫院 4 樓 A 區婦產科病房 (I-131 隔離病房)，請您當日先去住院服務中心報到，完成住院程序後，本科藥師於約定時間會把將核醫藥物送至您的病房內，藥師會進行衛教指導並指導您服用核醫藥物：I-131。</p>			
<p>注意事項</p>	<p>一、本檢查需禁食，至少禁食 4 小時以上。</p> <p>二、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。</p> <p>三、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。</p> <p>四、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性（其時效性極短且非常昂貴），為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本部受檢，請於受檢前兩個工作天通知本部，以利更改日期。</p>			

	五、本部影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 3-7 天。	
編碼	修訂日期 年 月 日	說明書修訂版本 第一版