



國立成功大學附設醫院  
核子醫學科

10號衛教單

檢查名稱  
碘-131 全身性攝影  
I-131 Whole Body Scan

檢查地點  
住院大樓(舊棟)一樓核子醫學科  
(請詳核醫地點圖示)

聯絡電話

(06)2353535-2470、2471

主要目的  
一、甲狀腺癌開刀後追蹤檢查

檢查流程

- 一、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫並核對您名字。
- 二、至注射室，醫護人員服藥前會與您做相關衛教及注意事項，衛教完後服用核醫藥物：I-131 3mci，服藥後即可先行離開，依醫護人員跟您約定的時間再回來造影(通常會跟您約定服用 I-131 藥物後 4 日回來造影)。
- 三、依照約定時間報到，至等候區等候，會有放射師出來呼叫、核對您的名字並通知您先解小便後至核醫造影室。
- 四、依放射師指示靜躺檢查床上造影約 10-20 分鐘，檢查中並不會有任何不適。

注意事項

- 一、本檢查無需禁食。
- 二、請停止服用抗甲狀腺藥物及含碘食品(如海帶、紫菜等)，至少停用 3-5 天(可視醫師需求調整病患停用抗甲狀腺藥物的時間)。
- 三、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。
- 四、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。
- 五、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。
- 六、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性(其時效性極短且非常昂貴)，為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不克至本科受檢，請於受檢前兩個工作天通知本科，以利更改日期。
- 七、本科影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 3 天。

發行日期： 109.01.30